

両眼白内障手術の治療を受けられる患者さまへ

患者ID		患者氏名		性別		病棟	6階病棟	入院日		月		日
★この用紙を入院当日にお持ちください				担当医師	北原 江			看護師				
入院期間	手術前日	手術当日(右・左)		手術後1日目	手術後2日目 (手術前日)	手術当日(右・左)		手術後1日目	2日目～退院			
		手術前	手術後			手術前	手術後					
日付	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
治療・処置・点眼 		①手術3時間前から点眼を始めます。(1時間おきに3回と入室時に1回) ②術衣に着替え点滴をします。	手術後は車イスで病室まで戻ります。 	9時頃に眼科診察になります。 診察後から両眼の点眼薬が開始になります。 		①手術3時間前から点眼を始めます。(1時間おきに3回と入室時に1回) ②術衣に着替え点滴をします。	手術後は車イスで病室まで戻ります。 	9時頃に眼科診察になります。 診察後から両眼の点眼薬が開始になります。 				
内服薬	いつも飲まれている薬は続けて服用してください。 											
注意点		手術室に入室しましたら、お名前とどちらの眼の手術であるかお答え下さい。		充血、異物感、痛みがある場合はスタッフまで連絡下さい。		手術室に入室しましたら、お名前とどちらの眼の手術であるかお答え下さい。		充血、異物感、痛みがある場合はスタッフまで連絡下さい。				
安静度 			手術後2時間ベットで安静にしてください。				手術後2時間ベットで安静にしてください。					
排泄 		手術前にトイレはすませてください。	手術2時間後にトイレに行くことは出来ます。			手術前にトイレはすませてください。	手術2時間後にトイレに行くことは出来ます。					
清潔		化粧はしないでください 指輪・眼鏡・時計は外していただきます				化粧はしないでください 指輪・眼鏡・時計は外していただきます						
食事 	お食事の中止はありません。 →											
説明・指導 	①看護師から日常生活についてお聞きします。 ②手術の説明と承諾書の確認をします。			①抗生物質は飲み切り中止になります。 ②点眼薬は5分づつあけて3種類を点眼 ③ギッター(網目の眼帯)は眼帯の代わりとして着用してください。 ④術後1週間は傷口の癒着が不十分で、細菌により感染の恐れがあるため、洗髪、洗顔の時は、水が入らないように注意してください。		①抗生物質は飲み切り中止になります。 ②点眼薬は5分づつあけて3種類を点眼 ③ギッター(網目の眼帯)は眼帯の代わりとして着用して下さい。 ④術後1週間は傷口の癒着が不十分で、細菌により感染の恐れがあるため、洗髪、洗顔の時は、水が入らないように注意してください。						

※上記内容は、患者様の容態により変更する事もありますのでご了承下さい。

※上記内容に関してご質問等ございましたら、スタッフまでご連絡下さい。