

水頭症シャント造設術

□服用されているお薬（ ） 月 日からは
服用しないでください。

休止薬なし

☆この用紙を入院当日にお持ちください		患者ID	患者氏名		性別	病棟	
特別な栄養管理の必要性	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	入院日	担当医師		担当看護師		
本人・家族	続柄		その他リハビリテーション等		入院という環境の変化、病状に伴い転倒するリスクが高くなる事があります。		
総合的な機能評価	《日常生活》	ほぼ自立(ランクJ)		《認知症》	なし		
入院期間	前日入院	手術当日		術後1日～2日目	術後3日～4日目	術後5日～退院(約17日間)	
		手術前	手術後				
患者状態							
投薬	持参の薬の内容を確認します。 血液をサラサラにする薬以外は服用を続けてください。 				抗生剤の内服をします。 		
注射		手術前から点滴をします。 					
処置			手術の後は心電図モニターをつけます。	創は汚したりぬらしたりしないようにしましょう。 創が安定するまで腹帯を付けます。 		術後1週間程度で抜糸をします。	
検査				朝9時頃にレントゲンがあります。 血液検査があります。  		術後1週間目にレントゲン、血液検査があります。	
観察項目			手術後はこまめに検温をします。				
安静			手術後3時間は臥床安静になります。 麻酔の影響で足に力が入りにくく 転びやすいので注意しましょう 	歩く練習を進めます。 シャントの流れを良くするため寝ている時も頭を少し高くします。 			
清潔	お臍をきれいにします。				介助でシャワー浴ができるようになります。 		
排泄			安静解除後トイレに行けます。 安静中のM/Lは尿瓶・便器を使って 床上となります。 	シャントの流れを良くするため便秘をしないようにしましょう。			
食事	食物アレルギーはお申し出ください。	朝・昼は絶食 	夕食から再開				
		飲水は可 					
説明指導	手術の説明・準備があります。 	医師から術後の説明がありますので ご家族の方は待機をお願いします。 					
リハビリ	リハビリスタッフにより手術前後の歩行能力などを確認します。 						

※この記載はあくまで標準的なものであり、症状に応じて変わる可能性があります。