

# 大腿骨頸部・転子部骨折骨接合術











\*服用されているお薬 ( )  
 月 日からは服用しないでください。その他の薬は服用を続けて下さい。

休止薬  
なし

患者ID	患者氏名	性別	病棟	入院日
------	------	----	----	-----

☆この用紙を入院当日にお持ちください

担当医師	担当看護師
------	-------

入院期間	手術前日	手術当日 ( 月 日 )	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目～退院 (約4週間)
治療			← ガーゼ交換を行います 患部をクーリングする場合があります			→	術後10～14日目に 抜糸予定です
処置	血栓予防の為、弾性ストッキングをはきます	手術後は翌朝まで酸素吸入・心電図モニター・フットポンプをつけます					
点滴		← 点滴をします  →					
観察項目		手術後はこまめに検温をします					
薬	持参薬の確認をします 血液をサラサラにする薬以外は服用を続けてください	朝胃薬が処方されます 指定された薬だけ飲みます	術後1日目より ①血液をサラサラにする薬以外は再開します ②血糖の薬は食事量に応じて再開します 術後2日目より ①抗生剤の内服をします(4日間)				血液をサラサラにする薬を休業していた場合、創部の状態に応じて再開します。
検査			血液検査があります 				以降、1週間ごとにレントゲン、血液検査があります。
安静度		術後はベット上安静です	車椅子乗車を開始していきます				
リハビリ	※リハビリがあります		※リハビリを開始します 	→			
排泄	オムツまたは便器を使用		トイレに車いすで行けるようになります				
清潔	手術前日までに入浴または清拭をします 		清拭をします 				手術1週間後から介助でシャワー浴が出来るようになります
食事	食物アレルギーはお申し出下さい。寝たままでも食べられるよう串刺しやおにぎりも出来ます	絶食です 	通常の食事に戻ります	→			
飲水		術前: 3時間前まで可 術後: しっかり覚醒したら可 					
説明・指導	手術の説明・準備があります	医師から術後の説明がありますので、ご家族の方は待機をお願いします 					

※この記載はあくまで標準的なものであり、症状に応じて変わる可能性があります。汐田総合病院 整形外科