

当院
では



(組換えワクチン) シングリックスワクチン
の接種を推奨しています

带状疱疹ワクチンとは

带状疱疹は、過去に水痘（水ぼうそう）にかかった時に体の中に潜伏した水痘带状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が出現する病気です。

当院
では



(組換えワクチン) シングリックスワクチンの接種を推奨しています

带状疱疹ワクチンとは

合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「带状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

带状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

当
院
で
は



(組換えワクチン) シングリックスワクチン
の接種を推奨しています

带状疱疹ワクチンには2種類あります

●生ワクチン 皮下に1回接種します。

●組換えワクチン

2か月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。
それぞれのワクチンの効果には違いがあります。



当
院
で
は



(組換えワクチン)

シングリックスワクチン の接種を推奨しています

带状疱疹に対する効果	生ワクチン	組換えワクチン
接種後1年時点	6割程度の予防効果	9割以上の予防効果
接種後5年時点	4割程度の予防効果	9割程度の予防効果
接種後10年時点	—	7割以上の予防効果

合併症の一つである带状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

当院
では



(組換えワクチン) シングリックスワクチンの接種を推奨しています

予防効果(年齢別)

生ワクチン→60歳以上 **51%**

年齢層別予防効果

50歳～59歳：69.8%

60歳～69歳：64.0%

70歳～79歳：41.0%

80歳以上：18%

当院
では



(組換えワクチン) シングリックスワクチン
の接種を推奨しています

予防効果(年齢別)

組換えワクチン→50歳以上 **97.2%**

年齢層別予防効果

50歳～59歳：96.6%

60歳～69歳：97.4%

70歳～79歳：91.3%

80歳以上：91.4%